

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΑΣ

Μια μελέτη για το Διαβήτη έδειξε πως τα παιδιά που χρησιμοποιούν μια θύρα ενέσεων, μπορεί να **μειώσουν τις τιμές της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης τους (HbA1c)**, περίπου 1% σε μόλις 6 μήνες.⁵




“Υπήρχαν φορές στο παρελθόν που ο διαβήτης με περιόριζε. Οι γονείς μου, έφερναν σνακ και φαγητό στις πρόβες και στους αγώνες τένις αλλά δεν τα έτρωγα γιατί δεν ήθελα να κάνω παραπάνω ενέσεις.

Τώρα με το **i-Port Advance®** μπορώ να απολαύσω το φαγητό, γιατί δεν με ενοχλεί να κάνω επιπλέον δόση και νιώθω ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη έφηβος στην αίθουσα.”

Lindsey, 16 ετών

ΑΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η θύρα έγχυσης i-Port Advance ενδείκνυται για ασθενείς οι οποίοι διαχειρίζονται ή στους οποίους χορηγούνται, πολλαπλές καθημερινές υποδόριες ενέσεις συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης και της ινσουλίνης. Η συσκευή μπορεί να παραμείνει στη θέση της για μέχρι και 72 ώρες για να διευκολύνει πολλαπλές ενέσεις φαρμάκου, χωρίς την ταλαιπωρία των επιπλέον τρυπημάτων με τη βελόνα. Τοπική φλεγμονή ή/και ερεθισμός είναι μια πιθανή επιπλοκή. Οι ασθενείς που εμφανίζουν τέτοια συμπτώματα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους ή/και να διακόψουν τη χρήση. Για πλήρεις λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος i-Port Advance.

ΑΣ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΜΑΖΙ



5 Burdick P, Cooper S, Horner B, Cobry E, McFann K, Chase HP. Use of a subcutaneous injection port to improve glycemic control in children with type 1 diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2009;10:116–119



Manufactured by:



Medtronic

Ελλάδα
Medtronic Hellas
Λεωφόρος Κηφισίας 24B,
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 2106779099
Φαξ: 2106779399

UC201711281 EL


i-Port Advance®

www.medtronic-diabetes.gr

Medtronic
Further. Together


3 ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ

Μετά την εφαρμογή του i-Port Advance μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε πολλαπλές ενέσεις



I-PORT ADVANCE®

VS



ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ

Στη διάρκεια 3 ημερών μπορεί να χρειαστεί να κάνετε έως και 30 ενέσεις. Με το i-Port Advance χρειάζεστε μόνο 1 εφαρμογή.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ I-PORT ADVANCE®³

Το i-Port Advance μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση της Βασικής και της Γευματικής Ινσουλίνης.



ΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝΣΟΥΛ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ)
Π.Χ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ LISPRO, ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ASPART



ΒΑΣΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΙΝΣΟΥΛ. ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ)
Π.Χ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ GLARGINE, ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ DETEMIR



**ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΠΟΝΟΣ¹**

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΝΕΣΕΙΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

**ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΓΧΟΣ¹**

**ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ²**

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ:



ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ



ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ



ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ⁴

100%

ΔΗΛΩΣΑΝ ΠΩΣ
ΤΟ I-PORT ΤΟΥΣ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ
ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ
ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΕΝΕΣΕΩΝ

98%

ΕΝΙΩΣΑΝ ΠΩΣ
ΤΟ I-PORT ΕΙΝΑΙ
ΑΝΕΤΟ ΝΑ ΤΟ
ΦΟΡΑΣ

99%

ΕΝΙΩΣΑΝ ΠΩΣ
ΤΟ I-PORT ΗΤΑΝ
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ

- Hanas R, Adolfsson P, Elfvin-Akesson K et al. Indwelling catheters used from the onset of diabetes decrease injection pain and pre-injection anxiety. *J Pediatr*. 2002;140(3):315-320
- Rabbone I, Bobbio A, Di Gianni V, Sacchetti C, Cerutti F. Intensive insulin therapy in preschool-aged diabetic children from multiple daily injections to continuous subcutaneous insulin infusion through indwelling catheters. *J Endocrinol Invest*. 2008;3(3):193-195
- Blevins T, Schwartz SL, Bode B et al. A study assessing an injection port for administration of insulin. *Diabetes Spectr*. 2008;21(3):197-202
- Riley D, Raup G. Impact of a subcutaneous injection device on improving patient care. *Nurs Manage*. 2010;41(6):49-50